

พลวง



ชื่อท้องถิ่น : กุง ควง ตึง, ตึงขาว (ภาคเหนือ)
พลวง, ยางพลวง (ภาคกลาง) พลอง, แลเท้า

ชื่อสามัญ : Gurjan, Pluang

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dipterocarpus tuberculatus* Roxb.

ชื่อวงศ์ : Dipterocarpaceae

ลักษณะทั่วไป

ลำต้น เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร เป็นไม้ผลัดใบ ลำต้นตรง กิ่งอ่อนมีรอยแผลใบขนาดใหญ่ เปลือกหนาสีน้ำตาลปนเทาอ่อน แตกเป็นร่องลึกไปตามยาวลำต้น เรือนยอดเป็นพุ่มกลม กิ่งแขนงมักคดงอ เนื้อไม้สีน้ำตาลแกมแดง

ใบ เป็นรูปไข่ กว้าง 15-28 เซนติเมตร ยาว 15-40 เซนติเมตร เนื้อใบหนา เกลี้ยงหรือมีขนกระจายห่าง ๆ โคนใบหยักเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบจักเป็นคลื่น ปลายใบสอบ ใบอ่อนสีน้ำตาลปนแกมแดง กาบหุ้มยอดอ่อนมีขนสั้น ๆ สีเทา ดอก สีม่วงแดง

ดอก ออกเป็นช่อเดี่ยวและออกตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง

การปลูก

1. ขนาดหลุมขุดหลุมลึกประมาณ 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต ระยะห่าง 2.5 x 2.5 เมตร
2. เมื่อขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เอาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันกับหน้าดินที่ขุดขึ้นมา แล้วกลบดินให้เต็มหลุมแล้วรดน้ำให้ชุ่ม
3. จากนั้นเจาะหลุมเล็ก ๆ ตรงกลางหลุมที่กลบให้เท่ากับขนาดของถุงชำต้นกล้าพลวงหรือขนาดโตกว่าเล็กน้อย เพื่อนำต้นกล้าพลวงลงปลูก
4. เมื่อเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วให้นำกล้าที่อยู่ในถุงชำไปแช่น้ำประมาณ 5 วินาทีแล้วค่อย ๆ ดึงถุงชำออก
5. เมื่อดึงต้นกล้าออกจากถุงชำแล้วให้นำต้นกล้ามาปลูกลงหลุมที่เตรียมไว้แล้วกลบดินให้แน่นปักไม้กันลมพัดล้มเป็นอันเสร็จ

การขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เมล็ดมีลักษณะเหมือนเมล็ดต้นยาง คือ เมล็ดกลมและมีปีก ซึ่งปีกจะทำให้เมื่อแก่จัดเมล็ดร่วงจากต้นแล้วปลิวลมไปได้ไกล

การดูแลรักษา

สำคัญยิ่งควรกรัดกิ่งหรือตัดพุ่มต้นเว้นระยะทำได้เมื่อต้นอายุ 1-3 ปีหรือต้นขึ้นเบียดกันแน่นควรตัดกิ่งล่างออกเพื่อต้นจะได้ขยายลำต้นใหญ่ขึ้น

ต้นพลวงสามารถขึ้นได้ทุกสภาพดิน แต่ถ้าสภาพดินเลวจัดควรปรับสภาพดินก่อน เพื่อบรรเทาความเป็นพิษของดินถ้าดินมีสภาพเป็นกรดจัดให้ใส่ปูนขาวดินมาร์ลหรือโดโรไมล์ ถ้าดินเป็นด่างจัดให้ใส่ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของกำมะถันหรือแอมโมเนีย-ซัลเฟต หรือปรับสภาพดินด้วยผงกำมะถัน ถ้าดินเค็มจัดให้ปล่อยน้ำให้ท่วมแปลงแล้วใส่วัสดุอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เช่น แกลบฟางข้าว ใบไม้หญ้าแห้ง ปุ๋ยหมักลงในดินเพื่อเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมในดิน และคลุมดินด้วยใบไม้หรือหญ้าแห้งเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำจากดิน เพราะการระเหยของน้ำจะดึงเกลือใต้ดินขึ้นมาที่ผิวดินทำให้ต้นไม้ตายได้

การกำจัดวัชพืชตัดหรือถางโดยใช้มีดหรือเครื่องตัดหญ้า

ประโยชน์

ใบสดสามารถใช้ห่ออาหาร สิ่งของได้เพราะมีขนาดใหญ่และหนา และเกษตรกรไร้สตรอเบอร์รี่ใช้รองใต้เถาต้นสตรอเบอร์รี่ เพื่อไม่ให้ผลสัมผัสดินซึ่งทำให้ผลเน่าหรือผิวไม่สวย เมื่อต้นอายุ 6-8 ปี สามารถเก็บใบมาใช้ทำหลังคาฝากันห้องหรือมุงบังที่อยู่อาศัยได้ โดยจะเก็บช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเมื่ออายุ 12 ปีขึ้นไปจะมีชันเอามาใช้ยาเรือ ทาเครื่องจักรสานต่าง ๆ

แหล่งข้อมูล : <https://www.xn--42cg8cuanoj5b9czdzg.com/>

