

สารภี

ชื่อท้องถิ่น : ทรพี (จันทบุรี) , สร้อยพี(ใต้),
สารภีแนน(เชียงใหม่,เหนือ)

ชื่อสามัญ : Negkassar

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Mammea siamensis*
T.Anderson

ชื่อวงศ์ : CALOPHYLLACEAE



ลักษณะทั่วไป

ลำต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่ผลัดใบ มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร ลักษณะเรือนยอดเป็นทรงพุ่มทึบ แตกกิ่งก้านแผ่กว้าง เปลือกลำต้นเป็นสีเทาอมน้ำตาลถึงดำ

ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับหรือเป็นรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบมนกว้าง ๆ บางทีอาจมีติ่งสั้น ๆ หรือหยักเว้าแบบตื้น ๆ โคนใบสอบเรียว ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีความกว้างประมาณ 2.5 - 7 เซนติเมตรและยาวประมาณ 7.5-25 เซนติเมตร

ดอก ออกดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อกระจุกตามกิ่ง ดอกย่อยเป็นสีขาว มีกลิ่นหอมมาก ดอกมีกลีบดอก 4 กลีบ ส่วนกลีบเลี้ยงมี 2 กลีบ มีเกสรตัวผู้สีเหลืองจำนวนมาก รังไข่มี 2 ช่อง ในแต่ละช่องมีไข่อ่อนจำนวน 2 ปลายหลอดรังไข่แยกเป็นแฉก 3 แฉก

ผล ผลมีลักษณะเป็นรูปกระสวยหรือกลมรี ขนาดประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร ผิวผลเรียบ ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองอมส้ม เนื้อผลนิ่ม ผลเมื่อแก่จะแตกออกได้ และมีเมล็ดเดียว

ระยะติดดอก - ผล

เริ่มติดดอก : มกราคม

สิ้นสุดระยะติดดอก : มีนาคม

เริ่มติดผล : มีนาคม

สิ้นสุดระยะติดผล : พฤษภาคม

การปลูก

1. นำกล้าไม้กฤษณามาชำไว้ในถุงพลาสติกจนกล้ามีความแข็งแรง
2. จึงย้ายมาปลูกในแปลง ด้วยระยะปลูก 5x5 เมตร
3. ลักษณะดินสภาพดินร่วนซุย ความชื้นพอเหมาะ

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

ประโยชน์

1. ผลสารภีมีรสหวาน ใช้รับประทานเป็นผลไม้ และยังเป็นอาหารของนกได้อีกด้วย นอกจากนี้จะใช้ผลรับประทานเป็นผลไม้แล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ เช่น ทำน้ำผลไม้ การทำไวน์ ทำแยม เป็นต้น
2. ดอกตูมของสารภีใช้สกัดทำสีย้อมผ้าได้ โดยจะให้สีแดง
3. ต้นสารภีมีเรื้อนยอดเป็นทรงพุ่มทึบ ใช้ปลูกเพื่อให้ร่มเงาและบังลมได้ อีกทั้งยังมีดอกและพุ่มใบที่สวยงาม จึงใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้

แหล่งข้อมูล :

[https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B5_\(%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89\)](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B5_(%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89))

