

นนทร

ชื่อเรียกพื้นเมือง : กระถินป่า กระถินแดง (ตราด)/
สารเงิน (แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Peltophorumpterocarpum* (DC.)
Backer ex K. Heyne

ชื่อวงศ์ : Leguminosae-Mimosoideae



ลักษณะทั่วไป

ลำต้น สูง 8-15 ม.

ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงเวียนสลับ ข้อแขนงใบย่อยเรียงตรงข้าม 9-16 คู่ ใบย่อย รูปขอบขนาน ปลายใบมนเว้าเข้าเล็กน้อย โคนใบสอบ ปลายใบมน เบี้ยว ใบทุ่หรือหยักเข้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบ

ดอก ออกเป็นช่อกระจุก ตามซอกใบ โกล่ปลายกิ่ง ช่อตั้งตรง ยาว 20-30 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ ขอบกลีบเกยทับกัน กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง กลีบยับย่น เกสรเพศผู้ 10 อัน

ผล เป็นฝักแบน ขนาด 2.5-10.0 ซม. ทั้งโคนและปลายฝักเรียวแหลม ฝักอ่อน สีเขียวพอแก่จัดออกสีน้ำตาลแดง

เมล็ด แบน มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก

การปลูก

ทำการปลูกโดยนำกล้าไม้จากแปลงเพาะไปปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ การปลูกโดยวิธีนี้จะได้ผลดีมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง แต่ต้องพิจารณาฤดูกาลปลูกให้เหมาะสมด้วย เช่น ควรย้ายปลูกขณะอากาศกำลังชุ่มชื้น ไม่ควรปลูกขณะมีฝนตกหนักเพราะดินจะแฉะเกินไปและดินแน่นอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ต้นไม้อาจตายได้

ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ เพราะออกดอกดก ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ดอกมีสีเหลืองสวยงาม นิยมปลูกไว้ในสถานที่ราชการต่างๆ อาทิ ตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย วัดวาอาราม และที่ราชการ เป็นต้น

เปลือก ใช้ต้มย้อมผ้า ให้ผ้าสีส้มอมชมพูหรือน้ำตาลอมชมพู

เนื้อไม้ นิยมนำมาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมถึงใช้งานงานก่อสร้าง อาทิ ไม้ปูพื้น ไม้ฝ้าเพดาน ไม้วงกบ เป็นต้น

แหล่งข้อมูล : <http://www.royalparkrajapruek.org/Plants/view?id=1256>

แหล่งข้อมูลภาพ : <https://sites.google.com/site/websitkeiywkbntncamcun/>

